

l'amabilité de son frère et à l'obligeance de son ami, M. Alluaud, toutes ces collections nous sont parvenues parfaitement intactes, et je les tiens, dès à présent, à la disposition des naturalistes. Ceux-ci peuvent, désormais, aborder facilement l'étude du groupe des Hémiptères; ils voudront, j'en suis sûr, rendre hommage à la mémoire de Noualhier en venant consulter au Muséum les matériaux qu'il a recueillis et continuer son œuvre en s'appliquant à les étudier.

*HÉMIPTÈRES GYMNOCÉRATES RÉCOLTÉS AU SÉNÉGAL PAR M. CHEVREUX
(CAMPAGNE DE LA GOËLETTE MELITA EN 1889-1890), AVEC LA DESCRIPTION DES ESPÈCES NOUVELLES,*

PAR FEU MAURICE NOUALHIER.

1°. — LISTE DES ESPÈCES ET PROVENANCES.

- CYDNUS LEPIDUS Stal. — Rufisque.
MACROSCYTUS PICINUS Stal. — Rufisque.
Macroscytus multisetosus nov. sp. — Rufisque.
CORIZUS HYALINUS Fab. — Dakar.
Serinetha Chevreuxi nov. sp. — Dakar.
Megalomerium picticorne nov. sp. — Sebi, Khotane.
MELANOCORYPHUS DELICATULUS Stal. — Rufisque.
LYGÆUS MIMUS Stal. — Dakar.
OXYCARENUS HYALINIPENNIS Costa. — Dakar.
Aphanus discrepans nov. sp. — Rufisque.
DIEUCHES ARMIPES Fab. — Rufisque.
DYODERCUS FASCIATUS Sign. — Rufisque.
MONANTHIA NATALENSIS Stal. — Sebi, Khotane.

2°. — DESCRIPTION DES ESPÈCES NOUVELLES.

Macroscytus multisetosus.

Oblongo-ovatus, nigro-piceus, antennis, rostro pedibusque totis rufo-testaceis; margines capituli thoracisque pilosi, sicut et costa hemelytrorum ubi puncta sex bis septem numerantur; caput parce lateribus punctatum, punctis obsoletis; lobi laterales capituli tylum fere includentes; thorax latera versus satis dense punctatus, disco fere lævis, margine postico leviter incrassato; scutellum præter basin remote punctatum, apice minute impressum; clavus lineis duabus punctorum notatus, exteriore ante medium evanescente; corii opaculi, remote punctulati, punctibus quam in scutello paulo densioribus, at paulo minoribus; linea impressa intramarginalis corii pone medium evanescent; membrana sordide hyalina; abdomen

medio laeve, lateribus opaculum et remote punctulatum; femora postica apice mutica, subtilis spinulis aliquot instructa. — Long. 6 mill.; latit. 3 mill. $\frac{1}{3}$. — ♂ ♀.

Coll. du Muséum de Paris.

Serinetha Chevreuxi.

Crocea, antennis, rostro pedibusque nigris; membrana nigro-fusca; parce et breviter (in abdomine longius) pubescens, pilis concoloribus; caput ante et post oculus obtusissime tuberculatum, jugis parum prominulis et tylo humilioribus; thorax medio carinatus, postici ante marginem transversim et tota latitudine tumidum, lateribus immarginatis, obtusis; collare anticum depressum, punctatum; foveae sat profundae, intus planae; hemelytra brevia, medio nonnihil ampliata, anum paulo superantia; rostrum medium tertii segmenti abdominis attingens. — Long. 12 mill.; lat. 4 mill. $\frac{1}{3}$. — ♂.

Coll. du Muséum de Paris.

S. haematicae simillima species; attamen forma brevior; rostro multo longiore, membrana multo minus extensa, thorace aliter constructo nec lateribus marginato omnino divergit.

Megalomerium pcticorne.

Testaceum, angustum, medio constrictum; latera tyli, capitis pagina inferior pectus basis abdominis, clava femorum articuli primae antennarum, humeri, macula magna baseos thoracis, vena interior corii et lineae quaedam membranae plus minusve fuscis; articulus ultimus antennarum, cornuque orificiorum eburnea; elytra et clavi inter venas pellucida, membranacea; caput parvum; vertex obtusus, a tylo impressione discretus; articulus primus rostri basin capitis haud attingens; antennae corpore duplo longiores, articulo ultimo fere dimidium praecedentis partem aequante; thorax punctatus, ante apicem bis transversim impressus, inter impressiones cicatricosus, a basi usque ad cicatricem carinatus, postice sinuatus, angulis posticis rotundato-extensis, modice reflexis; scutelli spina discoidalis retrorsum vergens, brevis, acuta; abdomen leviter virescens; pedes longissimi; membrana via ultra apicem abdominis extensa; orificiorum appendix magna, retrorsum vergens, apice oblique truncata ibique latior. — Long. 5 mill. $\frac{1}{4}$. — ♂.

Coll. du Muséum de Paris.

Aphanus discrepans.

Niger, opacus, limbo postico thoracis, scutelli apice, femoribus intermediis et posticis (apice excepto) flavis; elytra flavo-testacea. lineis pluribus in dimidio basali, fasciaque transversa maculam flavam ad angulum internum includente, nec non macula ante apicem ad suturam membranae, nigris; antennis fuscis, articulis secundo et tertio dilutioribus; tibiae tarsique fuscae; femora intermedia ante apicem nigro-annulata; clavus flavo-testaceus, limbo scutellari versus basin nigro, lineis duabus punctorum fuscorum notatus, lineis his a basi versus apicem modice convergentibus, linea exteriori recta, interiori vix sensim incurva; thoracis limbus posticus fusco-punctatus, lamina sinus lateralis impunctata, angulis posticis externe fuscis; angulus exterior apicalis pro et metapleurorum flavo-testaceus; femora

antica nigra; membrana fuscescens, ad angulum scutellarem et apice albo-maculata; caput distincte punctatum, sub-nitidum; membrana ultra apicem abdominis haud extensa. — Long. 5 mill. — ♀.

Coll. du Muséum de Paris.

CRUSTACÉS NOUVEAUX PROVENANT DES CAMPAGNES DU TRAVAILLEUR
ET DU TALISMAN,

PAR A. MILNE EDWARDS ET E.-L. BOUVIER.

Pa uridés (FIN).

Anapagurus ? dubius sp. nov.

Le bouclier céphalothoracique est orné d'un certain nombre de touffes de poils clairs qui paraissent occuper, surtout celles de la partie antérieure, une position constante. Les trois lobes frontaux sont sub-obtus et armés chacun d'une très petite pointe; celui du milieu est le plus large et le plus saillant.

Les pédoncules oculaires sont assez courts, leur cornée est peu dilatée et faiblement échancrée en dessus et en arrière; on trouve plusieurs rangées transversales de poils sur les pédoncules en arrière de la cornée. Les écailles ophtalmiques sont longues, aciculées et munies en dehors d'un acicule rudimentaire. Les pédoncules antennaires et antennulaires sont très allongés; le second article de ces derniers dépasse un peu la cornée en avant, le troisième dépasse les pédoncules antennaires et se termine par quelques soies très longues; le fouet antennulaire supérieur est un peu plus long que cet article; le fouet inférieur est plus court de moitié et ne compte que cinq articles. Le 1^{er} article des pédoncules antennaires est un peu visible en dehors et se termine en ce point par une sorte d'épine; le 2^e est muni d'un denticule aigu à l'angle interne de son bord supérieur et, en dehors, d'un prolongement acuminé qui dépasse l'extrémité de l'article suivant; ce dernier est armé en dedans et en avant d'un denticule; le 4^e article n'atteint pas tout à fait le bord antérieur de la cornée; le 5^e, qui est de beaucoup le plus grand, se termine par un fouet très développé qui dépasse longuement les pinces en avant, et dont le longueur est plus grande que celle du corps. L'acicule est grêle, peu arqué, frangé de longues soies en dedans et muni, au bout, d'une pointe aiguë; il atteint à peu près le milieu du dernier article pédonculaire.

Les pattes antérieures sont inégales et dissemblables; toutes deux sont ornées çà et là de quelques soies longues ou courtes, et à peu près complètement inermes. Par sa forme allongée et la courbe régulièrement ovale